

INTENCIÓN DE SUICIDIO EN ADOLESCENTES EN COLOMBIA COMPARADO CON LATINOAMÉRICA: REVISIÓN DE ALCANCE

Suicide intention in adolescents in colombia compared with latin america: scoping review

Dolly Villegas Arenas

<https://orcid.org/0000-0002-1584-7955>
Universidad Santiago de Cali.
Cali, Colombia.

Marleny Ruiz Agredo

<https://orcid.org/0000-0003-4945-7194>
Universidad Santiago de Cali.
Cali, Colombia.

Michael Pérez López

<https://orcid.org/0000-0001-5830-3504>
Universidad Santiago de Cali.
Cali, Colombia.

Jennifer Carolina Conde Cardozo

<https://orcid.org/0000-0003-4226-6133>
Universidad Santiago de Cali.
Cali, Colombia.

Resumen

Introducción: La adolescencia es el periodo de crecimiento y desarrollo humano que se produce después de la niñez y antes de la edad adulta. Durante esta etapa de la vida, los adolescentes suelen vivir intensamente; son muchos cambios físicos, emocionales y académicos que experimentan los cuales generan un gran estrés, que los puede desestabilizar y llevar a pensar en ideas suicidas. **Objetivo:** Describir la tendencia de la intención de suicidio en adolescentes en Colombia comparados con Latinoamérica. **Metodología:** Revisión de alcance

Cita este capítulo

Villegas Arenas D, Pérez López M, Ruiz Agredo M, Conde Cardozo JC. Intención de suicidio en adolescentes en Colombia comparado con Latinoamérica: revisión de alcance. En: Loaiza Buitrago DF, Díaz Chavarro BC, editoras científicas. Pensar, sentir, actuar: Esencia vital. Cali, Colombia: Editorial Universidad Santiago de Cali; 2022. p. 93-150.

de artículos publicados entre 2016 y 2020 y relacionada con los principales aspectos del intento de suicidio en adolescentes en Colombia y Latinoamérica. **Resultados:** La muestra totalizó 30 artículos, agrupados por similitud de contenido; se establecieron aspectos generales del intento de suicidio y unas categorías temáticas de factores de riesgo tanto para Colombia como para Latinoamérica. **Conclusión:** El intento suicida en adolescentes se constituye un problema en salud pública en Latinoamérica en general, este comportamiento está relacionado con múltiples factores, en Colombia se ha documentado que están relacionados con: disfunción familiar, aspectos sociales (acoso, desigualdad social, drogadicción y aspectos relacionados con la sexualidad) y enfermedad física y mental; en Latinoamérica, depresión, disfunción familiar, desesperanza y estrés.

Palabras clave: América Latina, conducta, adolescente, familia, suicidio.

Abstract

Introduction: Adolescence is the period of human growth and development that occurs after childhood and before adulthood. During this stage of life, adolescents tend to live intensely, there are many physical, emotional and academic changes they experience that generate great stress, which can destabilize them and lead them to think about suicidal ideas. **Objective:** To describe the trend of suicide intention in adolescents in Colombia compared to Latin America. **Methodology:** Scoping review of articles published between 2016 and 2020 and related to the main aspects of suicide attempt in adolescents in Colombia and Latin America. **Results:** The sample totaled 30 articles, grouped by similarity of content were established general aspects of suicide attempt and some thematic categories of risk factors for both Colombia and Latin America. **Conclusion:** Suicide

attempt in adolescents is a public health problem in Latin America in general, this behavior is related to multiple factors, in Colombia it has been documented that they are related to: family dysfunction, social aspects and physical and mental illness; in Latin America, depression, family dysfunction, hopelessness and stress.

Key words: Latin America, behavior, adolescent, family, suicide.

Introducción

De acuerdo con la OMS, la adolescencia es el periodo de crecimiento y desarrollo humano que se produce después de la niñez y antes de la edad adulta, entre los 10 y los 19 años; es una etapa de transición de la persona y se caracteriza por un ritmo acelerado de crecimiento y de cambios (1). Durante esta etapa de la vida, los adolescentes suelen vivir intensamente; son muchos cambios físicos, emocionales, académicos que experimentan, y con esto fuertes sentimientos de estrés, confusión, dudas de sí mismos, incertidumbre y otros miedos mientras van creciendo; en algunos adolescentes el divorcio de los padres o el embarazo a temprana edad los lleva a nuevas responsabilidades; otros cambios sociales, familiares y personales, los pueden perturbar e incrementar dudas de sí mismo, elementos que lo desestabilizan y quieren acabar con su vida, con lo que aparecen las ideas suicidas.

La idea suicida consiste en los pensamientos acerca de quitarse la vida; de acuerdo con la OMS, la ideación suicida y su final concreción en lesiones auto provocadas cobran un alto costo, con una mayor incidencia en la adolescencia y juventud temprana, constituyéndose en un problema de salud pública mundial (2). Es importante identificar ideas suicidas en adolescentes, ya que son el primer indicio del suicidio; el acto suicida tiene varias acciones, que inicia con la ideación; en

este momento de gran importancia, se presentan pensamientos intrusos que se repiten sobre causar su propia muerte, sobre las formas y las condiciones para morir. El suicidio es un proceso, esto incluye la ideación y el intento suicida, este conocimiento es fundamental para evitar que la persona llegue a la decisión suicida.

En América Latina los datos de suicidio son relativamente bajos, en comparación con otros países del mundo. Sin embargo, países como Bolivia y Uruguay presentan tasas desproporcionadamente elevadas. La falta de políticas públicas ante este problema es una constante en la región (3). En Colombia, la Encuesta Nacional de Salud Mental 2015 refleja la prevalencia de ideación suicida en adolescentes de 12 a 17 años es de 6,6 %, el intento de suicidio en este grupo de edad es de 2,5 %, y el 37,6 % de los adolescentes que han pensado suicidarse lo ha intentado no existiendo diferencias con la prevalencia de los adultos, 3.5% (4).

El impacto del suicidio en los adolescentes es grande, especialmente a nivel emocional y social; se requiere la mirada integral desde los aspectos físicos, sociales y psicológicos, que permita la identificación de la idea suicida y así fortalecer el enfoque investigativo en este grupo de personas, desarrollando líneas de investigación en salud mental del adolescente para el cuidado de la vida.

La identificación de la conducta suicida, y los indicadores emocionales evaluados, en los países de Latinoamérica, lleva a estrategias de promoción y de prevención en el cuidado de la salud mental del adolescente, dado que la ideación suicida se convierte en un predictor de intento suicida y de suicidios consumados, la relevancia de la ideación suicida en adolescentes y el impacto en la salud pública, se realizó la revisión de alcance con el objetivo de describir la tendencia de la intención de suicidio en adolescentes en Colombia comparados con Latinoamérica.

Marco referencial

La adolescencia es una etapa del ser humano en la que se presentan cambios tanto biológicos como sociales; estos cambios físicos, cognitivos, sexuales y emocionales generan expectativas en el niño y en la familia, en esta etapa los adolescentes suelen centrar interés en sí mismos, definen la identidad sexual, reclaman privacidad, y desarrollan autonomía.

La adolescencia, como periodo del desarrollo del ser humano abarca por lo general el periodo comprendido de los 11 a 19 o 20 años, en el cual el sujeto alcanza la madurez biológica, sexual, emocional y social; el cuerpo cambia, el pensamiento cambia y los sentimientos cambian con relación a casi todo, los adolescentes enfrentan la principal tarea, construir la identidad que los llevara a la adultez (5), la adolescencia es considerada también como una transición del desarrollo que presenta cambios físicos, cognitivos, emocionales y sociales, que están relacionados con el entorno social, cultural y económico, y principalmente con las relaciones familiares, el empleo, la escolaridad y el género (6).

La OMS, refiere que la probabilidad de supervivencia del adolescente está en relación con el lugar del mundo donde permanezca; en 2019, la probabilidad más alta de morir entre los 10 y los 24 años estaba África subsahariana, Asia central y meridional, Oceanía América Latina y el Caribe (7). Los principales problemas sanitarios para los adolescentes están relacionados con lesiones – traumatismo, violencia, salud mental, consumo de alcohol y drogas, consumo de tabaco, VIH/Sida, enfermedades infecciosas, embarazo y parto precoces, malnutrición y obesidad, actividad física. En esta etapa también aparece la conducta suicida (7, 8).

La conducta suicida está relacionada con intento de suicidio y el suicidio; las ideas de suicidio se relacionan con pensamientos y planes

de suicidio. Es necesario definir algunos términos. El intento de suicidio es un acto auto lesivo que finalmente no resulta mortal, puede causar lesiones; la idea suicida es el pensamiento o deseo de muerte, puede preceder al acto suicida si es una conducta impulsiva o puede presentarse antes de la planeación suicida; la planeación suicida, es la estructuración de la idea, que lleva unos pasos para que el acto suicida se realice de manera efectiva; el intento suicida, es una conducta potencialmente lesiva autoinfligida para generar la muerte y que no llegó a término fatal (9).

El suicidio es un acto autoinfligido con el fin de causar la muerte de manera voluntaria que comprende tres etapas (proceso suicida), el deseo suicida, la idea y el acto suicidas en sí (10), también es definido como el resultado de la víctima dirigida contra sí misma, que puede provocar una lesión auto producida o el suicidio, acciones que se reconocen como extremadamente peligrosas. (11) Existen factores que desencadenan la conducta suicida, como los genéticos, familiares, biológicos, los factores pueden ser de carácter personal o social como maltrato, abuso, académicos, laborales y socioeconómicos; la conducta suicida es considerada como multicausal, y en algunos casos por la interacción de los factores que se presentan tanto en adolescentes como en otros grupos etarios (12). Los factores más recientemente documentados son: tener un trastorno afectivo previo, intento de suicidio previo, abandono o ausentismo escolar, consumo de alcohol u otras sustancias, el absentismo escolar, tener un antecedente familiar de intento de suicidio, tener un trastorno de ansiedad, haber sufrido de maltrato infantil o acoso escolar, tener un bajo nivel educativo, tener un bajo nivel económico (13-16).

Existen personas o grupos en vulnerabilidad como es el género, la edad, el origen étnico, personas con enfermedad mental o con enfermedades infectocontagiosas como el SIDA, migrantes o personas

con diversidad de identidad sexual (17) y en víctimas de la violencia basada en el género (VBG) que es frecuente en estratos bajos, desplazamientos, hacinamiento entre otros aspectos y que se presenta en diferentes espacios incluyendo la misma familia (18, 19). Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el suicidio es un problema de salud pública grave a nivel mundial, genera impacto personal, familiar y social, es prevenible con intervenciones oportunas y con abordaje integral con la participación de todos los sectores (2) y, en consecuencia, es un asunto que debería preocupar a las autoridades, a los profesionales de la salud y al resto de la sociedad.

Metodología

Diseño de la revisión

Se llevó a cabo una revisión de alcance relacionada con los principales aspectos del intento de suicidio en adolescentes en Colombia y Latinoamérica. A partir de la Metodología PICO: (población, intervención, comparación, resultado), se formula la pregunta problema: ¿Cuál es el comportamiento de la intención de suicidio en adolescentes en Colombia comparado con Latinoamérica?, que permite dar cumplimiento al objetivo. Se realizó la formulación de palabras clave mediante la utilización de descriptores DeCS/ MeSH, que permitió la búsqueda sistemática en bases de datos electrónicas tales como: Redalyc, Scielo, Dialnet, PubMed y IntraMed; para complementar los elementos de búsqueda se utilizaron operadores booleanos como “OR”, y “AND” “NOT”. Los idiomas establecidos fueron el inglés y el español. El periodo de búsqueda de la información fue el segundo semestre del año 2020.

Criterios de selección

Criterios de Inclusión: Artículos publicados entre los años 2015 y 2020, en idioma español e inglés principalmente, cuyo objetivo esté rela-

cionado con intento de suicidio en adolescentes en Colombia, y en Latinoamérica; estudios que aborden una tendencia de este evento; estudios observacionales de cohorte, descriptivos, transversales, estudios cualitativos, revisiones bibliográficas, investigaciones con una valoración crítica positiva sobre la calidad del estudio y que se encuentren publicados en bases de datos electrónicas reconocidas. De Exclusión: Artículos sin una metodología sistemática clara, sin evidencia científica, artículos que no es posible acceder al documento completo.

Estrategias de búsqueda

Según el objetivo formulado, los criterios de selección y tras la combinación de los diferentes descriptores y buscadores, se realizó la primera aproximación a cada uno de los registros identificados; para esta fase se utilizó el diagrama de flujo PRISMA (20). Los registros obtenidos en esta primera fase fueron 1482 publicaciones, en Redalyc 724, en Scielo 314, en PubMed 270, en Dialnet 115, y en IntraMed 59; todos los autores realizaron lectura del resumen de los 1482 artículos, de ellos 1450 fueron excluidos, 1448 por no ajustarse a la pregunta orientadora y 2 por encontrarse en más de una base de datos (duplicados).

Tabla 1. Evolución de búsqueda sistemática.

Base de Datos	Algoritmos de búsqueda utilizados	Documentos identificados	Trabajos que cumplieron los criterios de selección
REDALYC	9	724	9
SCIELO	8	314	4
PUBMED	9	270	1
DIALNET	5	115	14

Base de Datos	Algoritmos de búsqueda utilizados	Documentos identificados	Trabajos que cumplieron los criterios de selección
INTRAMED	2	59	4
Total	33	1.482	32

Fuente: elaboración propia

Proceso de selección

Los 32 artículos que cumplieron los criterios de elegibilidad fueron sometidos a un análisis de contenido realizado por los investigadores; se hizo lectura crítica del texto completo que permitió corroborar nuevamente los criterios de selección y valorar el rigor metodológico de acuerdo con el diseño y basados en los criterios de *Joanna Briggs Institute* (21). La revisión de los artículos y su respectiva clasificación se realizó en forma cruzada por parte de los autores y de este análisis se excluyeron dos artículos por bajo nivel de evidencia. Los desacuerdos se resolvieron por consenso entre los autores.

El diagrama de flujo PRISMA resalta la trazabilidad de los artículos identificados, la selección de los sometidos a revisión y los elegibles para discusión (figura 1). La consolidación de la información se realizó en un instrumento consistente en una hoja de cálculo con las principales características.

Extracción de los datos

La fase analítica permitió identificar 30 artículos que se consideraron que aseguraban una buena calidad metodológica y bajo riesgo de sesgo. los cuales fueron caracterizados; la información fue consolidada en una tabla de Excel, que incluía, el título, autor, año, país, objetivo,

metodología, participantes, resultados y conclusión, Cada uno de los autores realizó análisis de la información.

Aspectos éticos

Los autores declaran que para la presente revisión no se realizó manipulación intencionada de las variables biológicas, fisiológicas, psicológicas o sociales de los individuos.

Confidencialidad de los datos

Los autores declaran que han seguido los lineamientos de la Ley 44 de 1993, respetando la autoría de los artículos referenciados.

Resultados

Tras la revisión de la bibliografía se identificó un total de 30 estudios, que fueron consolidados de acuerdo con las principales características (tabla 2).

De acuerdo con los artículos incluidos en la revisión y con el año de publicación, se señala que principalmente fueron del año 2019; los países con mayores publicaciones fueron Colombia, Perú y Ecuador y la metodología más frecuente fue el diseño cuantitativo no experimental. Los adolescentes fueron los principales sujetos de investigación; los instrumentos aplicados fueron principalmente: Escala de Ideación Suicida de Beck (5), Escala de Ideación Suicida Positiva y Negativa – PANSI- (5), Escala de Ideación Suicida de Roberts (4), Escala de screening de suicidalidad de Okasha (3), y Escala de funcionamiento familiar - APGAR familiar- (3); con relación a los objetivos de las publicaciones estaban en relación con: Identificación de riesgos (9), Conductas (6), Caracterización del intento suicida (15). En la tabla 3 se relacionan las publicaciones.

Una vez revisados los estudios seleccionados, se identificaron aspectos que inciden en la intención de suicidios en los adolescentes; en Colombia los riesgos que afectan la salud mental del adolescente generando ideación e intención de suicidio son la disfunción familiar, aspectos sociales como el acoso social en sus diferentes expresiones (acoso escolar, siberacoso, desigualdad social, consumo de sustancias psicoactivas, la identidad sexual y el abuso sexual) la enfermedad física y mental también ejercen influencia en la intención de suicidio en el menor.

En los países de América Latina las principales condiciones que son riesgo para la intención de suicidio en el adolescente son la disfunción familiar, la depresión y estados de ánimo, desesperanza y estrés. Se resalta entonces la importancia de la familia frente a este fenómeno social y de alto impacto en salud pública.


Tabla 2. Características de las publicaciones.

Año	No	País	No	Diseño	No
2015	1	Colombia	9	Descriptivo	21
2016	2	Perú	5	Cualitativo	8
2017	4	Ecuador	4	Revisión de literatura	1
2018	7	Chile	2		
2019	12	Costa Rica	2		
2020	4	México	2		
		Venezuela	2		
		Brasil	1		
		Cuba	1		
		Puerto Rico	1		
		Chile Colombia	1		

Fuente: elaboración propia.

El análisis crítico a partir de los criterios del Joanna Briggs Institute, permitió evidenciar que las publicaciones incluidas en la revisión presentaron calidad metodológica con un puntaje por encima de 80 %.

Figura 1. Diagrama de flujo que representa la búsqueda en las bases de datos. 2016 – 2020.



Fuente: McKenzie, Bossuyt, Boutron, Hoffmann & Mulrow (2020) (6).

Tabla 3. Estudios analizados y principales resultados.

NOMBRE DEL ARTÍCULO	ASPECTOS	
Autolesão sem intenção suicida entre adolescentes	Autores	Paulo Henrique Nogueira da Fonseca; Aline Conceição Silva; Leandro Martins Costa de Araújo; Nadja Cristiane Lappann Botti.
	Lugar y Fecha	Brasil (2018)
	Objetivo	Evaluar la frecuencia y características de las autolesiones en adolescentes.
	Metodología	Observacional de corte trasversal
	Participantes	Adolescentes
	Instrumentos	Escala de Comportamiento de Autolesión
	Resultados	De 517 adolescentes, el 9,48% reporta autolesión cinco veces más, en el último año; las mujeres muestran más conducta auto lesiva, las principales causas son eliminar los sentimientos de vacío o indiferencia y detener malos sentimientos. Se observa que la autolesión entre los adolescentes, en su mayor parte, no tiene intención suicida.
	Conclusiones	La autolesión es aludida por los adolescentes tanto con la función de regular las emociones (refuerzos automáticos) como para tratar de controlar situaciones externas (refuerzos sociales). En este sentido, los esfuerzos de intervención preventiva deben centrarse en reducir los problemas que contribuyen a la aparición de autolesiones

NOMBRE DEL ARTÍCULO	ASPECTOS	
Las distorsiones cognitivas y el riesgo de suicidio en una muestra de adolescentes chilenos y colombianos: un estudio descriptivo-correlacional	Autores	Luisa Victoria Álvarez - Nora Yamilet Ayala Moreno, Ricardo Bascuñán Cisternas
	Lugar y Fecha	Chile - Colombia (2019)
	Objetivo	Determinar la relación entre las distorsiones cognitivas y el riesgo de suicidio en una muestra de adolescentes chilenos y colombianos.
	Metodología	Observacional de corte trasversal.
	Participantes	Adolescentes.
	Instrumentos	Inventario de Pensamientos Automáticos de Ruiz y Lujan
	Resultados	Entre adolescentes chilenos y colombianos existe relación estadísticamente significativa entre las distorsiones cognitivas y riesgo de suicidio, y las siguientes distorsiones: filtraje, interpretación del pensamiento, pensamiento polarizado y sobre-generalización. La correlación es positiva y alta
Conclusiones	Los resultados del presente estudio permitirán prevenir el riesgo de suicidio en adolescentes chilenos y colombianos mediante la evaluación de estas distorsiones cognitivas, las que también podrán guiar intervenciones psicoterapéuticas reduciendo significativamente la severidad y riesgo de cometer suicidio	

NOMBRE DEL ARTÍCULO	ASPECTOS	
Riesgo de suicidio adolescente en localidades urbanas y rurales por género, región de Coquimbo, Chile	Autores	Ardiles-Irarrázaval RA, Alfaro-Robles PA, Díaz-Mancilla IE, Martínez-Guzmán VV.
	Lugar y Fecha	Chile (2019)
	Objetivo	Comparar el riesgo de suicidio de adolescentes de enseñanza media, residentes de localidades urbanas y rurales por género en la región de Coquimbo, Chile.
	Metodología	Observacional de corte trasversal
	Participantes	Adolescentes
	Instrumentos	Escala de screening de suicidalidad de Okasha.
	Resultados	Se encuestaron 349 adolescentes, el 25,5% con riesgo de suicidio, el 15,76% de las mujeres con riesgo mostrando diferencia significativa con los hombres. No hay diferencias según localización geográfica
	Conclusiones	El suicidio es un problema de salud pública mundial, sobre el que no se ha abordado adecuadamente a nivel de prevención y promoción en salud; existe diversidad de factores que influyen en el riesgo suicida y el factor asociado al género femenino presenta un mayor riesgo; mientras que la ubicación geográfica de residencia no registra riesgo.

NOMBRE DEL ARTÍCULO	ASPECTOS	
<p>Jóvenes y subjetividad negada: Apuntes para pensar la intervención socioeducativa sobre prácticas autolesivas y suicidio.</p>	Autores	Kaplan, Carina V; Szapu, Ezequiel.
	Lugar y Fecha	Chile (2019)
	Objetivo	Comprender la construcción social de las emociones en la vida escolar y sus relaciones con la producción de las violencias
	Metodología	Revisión de literatura
	Participantes	Adolescentes
	Instrumentos	Revisión de literatura
	Resultados	Se identifican dos dimensiones; manifestaciones de rechazo o exclusión dado por los rasgos del cuerpo y sufrimiento provocado por el rechazo y la subvaloración, esta dimensión se realizó teniendo como centro las autoagresiones físicas y el suicidio. Resalta la importancia de entender la intención de suicidio y dejar de verlo como una conducta individual que es ajena a la sociedad.
	Conclusiones	La juventud acarrea una historia de generaciones que han estado expuestas a procesos de exclusión, tanto material como simbólica, en los que las instituciones educativas han ocupado un rol importante.

NOMBRE DEL ARTÍCULO	ASPECTOS	
Factor de riesgo suicida según dos cuestionarios, y factores asociados en estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia sede Manizales.	Autores	José Jaime Castaño Castrillón, Sandra Constanza Cañón, Marcela Betancur Betancur, Paula Lorena Castellanos Sánchez, Johanna Guerrero González Alejandra Gallego Rivas, Catalina Llanos Calderón.
	Lugar y Fecha	Colombia (2015)
	Objetivo	Determinar el factor de riesgo suicida según dos cuestionarios y factores asociados que presentan los estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales (Caldas, Colombia) en la jornada diurna
	Metodología	Observacional de corte trasversal
	Participantes	Adolescentes
	Instrumentos	Escala de Ideación Suicida Positiva y Negativa (PANSI), actitudes negativas hacia la propia homosexualidad u HI.
	Resultados	Muestra conformada por 255 estudiantes universitarios. según Plutchik; riesgo suicida de 19,7%, y según Beck 6,7%. Buena función de la familia: 39,8%. Se encontró una relación significativa entre el FR suicida con género, musical metal, depresión y funcionalidad familiar. Según Plutchik, en factores como el género, el gusto por el metal y la balada, la presencia de cuadros depresivos y la funcionalidad familiar
	Conclusiones	Necesidad de intervenciones preventivas tempranas en procura de una salud sexual libre de coerciones, procurando eliminar la HI mediante terapias afirmativas de la orientación sexual diversa.

NOMBRE DEL ARTÍCULO	ASPECTOS	
Ciberacoso y comportamiento suicida. ¿Cuál es la conexión? A propósito de un caso	Autores	Juliana Escobar Echavarría, Laura Elisa Montoya González, Diana Restrepo Bernal y David Mejía Rodríguez
	Lugar y Fecha	Colombia, 2017
	Objetivo	Presentar el caso clínico de una adolescente víctima de <i>cyberbullying</i> con síntomas depresivos y comportamiento suicida.
	Metodología	Reporte de caso
	Participantes	Adolescente.
	Instrumentos	Revisión de registros
	Resultados	Se presenta un reporte de caso, tratado en un hospital de Medellín debido a dos intentos de suicidio que se identificaron como relacionados con las redes sociales
	Conclusiones	Este caso nos sensibiliza sobre la relación entre el crecimiento de redes sociales y el acoso cibernético. No podemos establecer la causalidad, pero podríamos deducir que algunos contenidos en la web podrían propiciar un mayor riesgo de enfermedad mental para los jóvenes que están expuestos y vulnerables

NOMBRE DEL ARTÍCULO	ASPECTOS	
Ideación suicida, funcionalidad familiar y consumo de alcohol en adolescentes de Colombia	Autores	Ingrid Forero, Elsa Siabato, Yenny Salamanca.
	Lugar y Fecha	Colombia (2017)
	Objetivo	Analizar la asociación entre ideación suicida, funcionalidad familiar y consumo de alcohol en adolescentes de colegios públicos de la ciudad de Tunja.
	Metodología	Observacional de corte trasversal
	Participantes	Adolescentes
	Instrumentos	Escala de Ideación Suicida Positiva y Negativa (PANSI), Escala de funcionamiento familiar (APGAR familiar), Alcohol Use Disorders Identification Test
	Resultados	289 participantes, en edades entre 13 y 17 años, el 28,4% presenta un nivel alto de ideación suicida negativa, el 28% ideación suicida positiva (ISP), el 67% refiere familia funcional. El análisis bivariado demostró riesgo de ideación suicida positiva en adolescente que perciben disfuncionalidad familiar grave.
	Conclusiones	Continuar con el estudio de variables sociodemográficas, profundizar sobre elementos tales como la influencia de los pares y del contexto social en general, como elementos de riesgo y/o protección en el fortalecimiento de las redes familiares.

NOMBRE DEL ARTÍCULO	ASPECTOS	
Intento e ideación suicida y su asociación con el abuso sexual en adolescentes escolarizados de Boyacá – Colombia.	Autores	Mónica Patricia Pérez Prada, Lizeth Cristina Martínez Baquero, Mildred Alexandra Vianchá Pinzón, Bertha Lucía Avendaño Prieto.
	Lugar y Fecha	Colombia (2017)
	Objetivo	Identificar la presencia del intento e ideación suicida, abuso sexual y la asociación entre estas variables en estudiantes de educación secundaria.
	Metodología	Observacional de corte trasversal
	Participantes	Adolescentes y jóvenes
	Instrumentos	Escala de Ideación Suicida Positiva y Negativa (PANSI).
	Resultados	15,5% de los participantes con intento de suicidio, con predominio de mujeres, de los estudiantes que presenta riesgo de ideación suicida, el 11.5 % ha sido víctima de abuso sexual por tocamiento. De los estudiantes que han sufrido abuso sexual por penetración el 52 % presenta riesgo de ideación suicida.
	Conclusiones	Diseñar programas y políticas que prevengan y mitiguen la problemática del suicidio; de la misma manera los resultados de este estudio deben encender las alarmas de las autoridades y las instituciones frente al fenómeno del abuso sexual, ya que como se mencionó anteriormente el porcentaje hallado de víctimas de este flagelo es superior al de otras poblaciones.

NOMBRE DEL ARTÍCULO	ASPECTOS	
Asociación entre depresión e ideación suicida en un grupo de adolescentes colombianos	Autores	Elsa Fernanda Siabato Macías, Ingrid Xiomara Forero Mendoza, Yenny Salamanca Camargo.
	Lugar y fecha	Colombia, (2017)
	Objetivo	Identificar la presencia del intento e ideación suicida, abuso sexual y la asociación entre estas variables en estudiantes de educación secundaria.
	Metodología	Observacional de corte trasversal
	Participantes	Adolescentes y jóvenes
	Instrumentos	Escala de Ideación Suicida Positiva y Negativa (PANSI), Cuestionario de Depresión Infantil (CDI)
	Resultados	15,5% de los participantes con intento suicidio, con predominio de mujeres, de los estudiantes que presenta riesgo de ideación suicida, el 11.5 % ha sido víctima de abuso sexual por tocamiento. De los estudiantes que han sufrido abuso sexual por penetración el 52 % presenta riesgo de ideación suicida.
	Conclusiones	Los síntomas depresivos relacionados con estado de ánimo y autoestima negativa son factores de riesgo relevantes asociados con el componente cognitivo de la conducta suicida en mujeres adolescentes.

NOMBRE DEL ARTÍCULO	ASPECTOS	
Asociación entre apego y riesgo suicida en adolescentes escolarizados de Colombia.	Autores	Yuly Suárez Colorado, Adalberto Campo-Arias.
	Lugar y Fecha	Colombia (2019)
	Objetivo	Establecer la asociación entre la confianza, comunicación y alienación y el riesgo suicida en adolescentes escolarizados de Colombia.
	Metodología	Observacional de corte trasversal
	Participantes	Adolescentes
	Instrumentos	Inventario de apego de Armsden & Greenberg, Escala de riesgo suicida de Plutchik.
	Resultados	39 adolescentes encuestados, se identificó prevalencia de mujeres, se identificó que la baja comunicación, la baja confianza y la alta alienación con la madre y con el padre presentan riesgo suicida.
	Conclusiones	La baja confianza y baja comunicación con madre y padre son factores de riesgo para el alto riesgo suicida en adolescentes escolarizados de una ciudad colombiana. Es necesario ampliar la investigación de esta asociación en otras poblaciones, así como considerar otros factores mediadores.

NOMBRE DEL ARTÍCULO	ASPECTOS	
Factores de riesgo de ideación suicida en una muestra de adolescentes y jóvenes colombianos autoidentificados como homosexuales	Autores	Carlos Alejandro Pineda-Roa
	Lugar y Fecha	Colombia (2019)
	Objetivo	Indagar los factores de riesgo de ideación suicida en varones jóvenes residentes en Bogotá (Colombia) que se autodefinen como homosexuales.
	Metodología	Observacional de corte trasversal
	Participantes	Adolescentes y jóvenes,
	Instrumentos	Escala de Ideación Suicida Positiva y Negativa (PANSI), Escala de actitud hacia la homosexualidad (HI).
	Resultados	Poca ideación suicida, el 18,4%, nivel moderado, el 24,6%, y en el 24%, el abuso sexual es el principal factor asociado con ideación. Los adolescentes con mayor riesgo que los jóvenes. (OR = 3,63; IC95%, 1,35-9,76; p = 0,010).
	Conclusiones	Indican la necesidad de intervenciones preventivas tempranas en procura de una salud sexual libre de coerciones, procurando eliminar la HI mediante terapias afirmativas de la orientación sexual diversa.

NOMBRE DEL ARTÍCULO	ASPECTOS	
Sentimientos y Pensamientos de Jóvenes Frente al Acoso Escolar: El Suicidio Como Una Alternativa.	Autores	Palacio-Chavarriaga, Catalina; Rodríguez-Marín, Leidy Johana; Gallego-Henao, Adriana María.
	Lugar y Fecha	Colombia (2019)
	Objetivo	Dar a conocer algunos sentimientos, pensamientos y visiones que tienen los estudiantes de noveno grado frente al tema del acoso escolar.
	Metodología	Cualitativo
	Participantes	Adolescentes
	Instrumentos	Entrevista y técnicas interactivas.
	Resultados	Los jóvenes y adolescentes ven el suicidio como alternativa para enfrentar el acoso escolar.
	Conclusiones	Es importante sensibilizar a los maestros a no limitar sus acciones al momento de evidenciar conductas agresivas entre los estudiantes sino más bien preocuparse por desarrollar la empatía entre estos, de tal manera que sean capaces de ponerse en el lugar del otro.

NOMBRE DEL ARTÍCULO	ASPECTOS	
Ideación suicida y funcionalidad familiar en adolescentes del Caribe Colombiano.	Autores	Núñez-Ariza, Andryn Reyes Ruiz, Lizzeth Sánchez-Villegas, Milgen
	Lugar y Fecha	Colombia (2020)
	Objetivo	Describir y determinar la relación entre la ideación suicida y la funcionalidad familiar en una muestra de adolescentes del Caribe colombiano.
	Metodología	Observacional de corte trasversal
	Participantes	Adolescentes
	Instrumentos	Escala de Ideación Suicida de Roberts-CES-D, Escala de funcionamiento familiar (APGAR familiar).
	Resultados	Ausencia de ideación suicida en el 51,5%, con predominio en mujeres, se encontró relación positiva significativa bilateralmente, entre la función familiar y la alerta o riesgo de ideación suicida.
	Conclusiones	La disfunción familiar aumenta el riesgo de ideación suicida. Se discute el papel de la familia como factor de protección o como posible factor de riesgo para la disposición de los jóvenes hacia el suicidio.

NOMBRE DEL ARTÍCULO	ASPECTOS	
Análisis psicosocial del suicidio en personas jóvenes indígenas Bribris.	Autores	Arroyo Araya, Helga; Herrera González, Damián Gerardo.
	Lugar y Fecha	Costa Rica (2019)
	Objetivo	Recuperar el proceso reflexivo de construcción colectiva de saberes, realizado en conjunto con personas líderes, actores institucionales y personas jóvenes de las comunidades indígenas Bribris.
	Metodología	Cualitativo
	Participantes	Jóvenes indígenas
	Instrumentos	Entrevista
	Resultados	Los factores relacionados con los suicidios a un trauma psicosocial asociado con violencia política, social, cultural y económica, la acción no busca terminar con la vida, busca terminar un sufrimiento.
	Conclusiones	El vínculo y el fortalecimiento de lo cultural constituyen las vías de resistencia para afrontar esta problemática

NOMBRE DEL ARTÍCULO	ASPECTOS	
<p>Caracterización clínica y socio-demográfica de los pacientes con ideación suicida e intentos de autoeliminación en la población de 4 a 13 años, atendidos en el Hospital Nacional de Niños.</p>	Autores	Carlos Sáenz Herrera, Andrea Rodríguez González.
	Lugar y Fecha	Costa Rica (2020)
	Objetivo	Describir la presentación clínica y socio-demográfica de la ideación suicida y los intentos de autoeliminación en la población de 4 a 13 años atendida en el Hospital Nacional de niños de 01 de junio de 2012 al 01 de junio de 2018.
	Metodología	Observacional de corte trasversal
	Participantes	Adolescentes
	Instrumentos	Revisión de registros
	Resultados	Muestra conformada por 63 menores de edad, 40% con ideas suicidas, una relación significativa entre las variables ideación suicida y abuso sexual, antecedente personal de ideas suicidas y la comorbilidad con enfermedades psiquiátricas, principalmente el trastorno conductual.
	Conclusiones	La población infanto juvenil con mayor vulnerabilidad y propensa a manifestar conductas suicidas son aquellos jóvenes con comorbilidades psiquiátricas, antecedentes de abuso sexual y antecedentes familiares de conductas suicidas

NOMBRE DEL ARTÍCULO	ASPECTOS	
Comportamiento del intento suicida en adolescentes del policlínico “Julio Grave de Peralta”. Febrero 2017 – marzo 2018.	Autores	Yais Palanque Yalieth Yais Elcea Jesús.
	Lugar y Fecha	Cuba (2019)
	Objetivo	Identificar el comportamiento del intento suicida en adolescentes del Policlínico Julio Grave de Peralta en el período de febrero 2017- marzo 2018.
	Metodología	Observacional de corte trasversal
	Participantes	Adolescentes
	Instrumentos	Revisión de registros
	Resultados	46 adolescentes, la mayor cantidad de intentos suicidas se realizan en las edades de 15-19 años, la agresividad es el problema más prevalente, se evidencia una relación entre los intentos suicidas en los adolescentes, antecedentes psiquiátricos de ellos y familiares, son frecuentes los problemas relacionados con, el entorno, la familia, y con las relaciones interpersonales.
Conclusiones	Elevada incidencia de los adolescentes en el comportamiento suicida del área de salud. Prevalecen los intentos suicidas en adolescente del sexo femenino, el grupo etario de mayor incidencia fue el de 15-19 años. Los casos presentan al menos una afectación en algunas de las variables.	

NOMBRE DEL ARTÍCULO	ASPECTOS	
Factores predictores y protectores para tendencias suicidas en adolescentes en una zona afectada por el terremoto del 16 de abril en Ecuador.	Autores	Rebekka Maria Franziska Gerstner
	Lugar y Fecha	Ecuador (2018)
	Objetivo	Conocer la prevalencia periódica de los eventos de salud mental (depresión, ansiedad y estrés postraumático) y las tendencias suicidas, así como la relación entre los factores de riesgo y protectores con la tendencia suicida en adolescentes que viven en Muisne, una zona fuertemente afectada por el terremoto del 16 de abril.
	Metodología	Observacional de corte trasversal
	Participantes	Adolescentes
	Instrumentos	Escala Infantil de Síntomas del Trastorno de Estrés Postraumático, Escala de Ansiedad de Spence (SCAS), Escala de Ideación Suicida de Roberts-CES-D, Duke University Religion Index (DUREL), Escala de funcionamiento familiar (APGAR familiar), Escala de screening de suicidalidad de Okasha.
	Resultados	Prevalencia alta de ideación suicida, estrés postraumático, depresión y ansiedad. Los estudiantes con alta tendencia suicida tienen elevados niveles de estrés postraumático, depresión y ansiedad y menor grado de funcionalidad familiar.
	Conclusiones	Se recomienda iniciar acciones de salud pública basadas en la evidencia para disminuir la tendencia suicida y eventos de salud mentales como depresión, ansiedad y estrés postraumático que pueden provocar altos costos a la sociedad, si no son tratados a tiempo

NOMBRE DEL ARTÍCULO	ASPECTOS	
<p>Detección temprana de ideación suicida e identificación de los factores de riesgo asociados, en adolescentes de dos unidades educativas del sur de la ciudad de Quito en el periodo septiembre 2017 a febrero 2018</p>	Autores	Aguirre Gordon Alexandra Maricela Auquilla Salcan Isabel del Carmen.
	Lugar y Fecha	Ecuador (2018)
	Objetivo	Determinar la prevalencia de las ideas suicidas y sus factores asociados, en adolescentes de las unidades educativas fiscal “5 de junio” y particular “San José La Salle” de Quito.
	Metodología	Observacional de corte trasversal
	Participantes	Adolescentes
	Instrumentos	Encuestas
	Resultados	La prevalencia de la ideación suicida fue de 26.32%, principalmente en mujeres. Síntomas de depresión en el 61,5% de los adolescentes, disfunción familiar en el 59% y bullying en el 16%. Relación estadísticamente significativa entre Ideación Suicida y grupo etario de 14 a 16 años, depresión, disfunción familiar, <i>bullying</i> e intento de suicidio.
	Conclusiones	Existe relación estadísticamente significativa entre Ideación Suicida y grupo etario de 14 a 16 años, depresión, disfunción familiar, <i>bullying</i> e intento de suicidio.

NOMBRE DEL ARTÍCULO	ASPECTOS	
El riesgo suicida y la auto identificación étnica en adolescentes indígenas de Quisapincha, Ecuador	Autores	Santiago Paredes B, Oscar Pérez S.
	Lugar y Fecha	Ecuador (2020)
	Objetivo	Determinar estadísticamente la existencia de una relación entre el riesgo suicida y la auto identificación étnica de los adolescentes de segundo y tercer año de la Unidad Educativa Quisapincha, así como la descripción de los niveles de riesgo, relación con el sexo y la identificación étnica.
	Metodología	Observacional de corte trasversal
	Participantes	Adolescentes
	Instrumentos	La Escala de Identidad Étnica Multigrupo, la Escala de Desesperanza de Beck.
	Resultados	El 52% de la población presenta un riesgo leve de intención de suicidio, con una relación significativa entre la auto identificación como indígena y la conducta suicida
	Conclusiones	Plantear alternativas de prevención en el ámbito comunitario y de la salud mental como podría ser un grupo terapéutico para el trabajo con adolescentes, reconociendo así la importancia de conferir a la identidad como recurso protector frente a conductas de riesgo en población adolescente.

NOMBRE DEL ARTÍCULO	ASPECTOS	
Conducta suicida en adolescentes y factores asociados.	Autores	Adriana Elizabeth Ordoñez Fernández.
	Lugar y Fecha	Ecuador (2019)
	Objetivo	Establecer los factores asociados en la conducta suicida que afectan a los adolescentes.
	Metodología	Revisión de literatura
	Participantes	Adolescentes
	Instrumentos	Revisión de literatura
	Resultados	Los factores relacionados con la conducta suicida en los adolescentes son: factores psicológicos (estado depresivo); social (problemas familiares, acoso escolar y la violencia familiar); individual (baja autoestima). otros factores de menor (el consumo del alcohol, abuso sexual, estrés social, entre otros).
	Conclusiones	Los factores asociados en la conducta suicida en adolescentes, son: factores psicológicos como el estado depresivo; sociales como problemas familiares, acoso escolar y violencia familiar; individuales como la depresión y baja autoestima, y finalmente otros factores de menor relación como el consumo del alcohol, abuso sexual, estrés social, entre otros.

NOMBRE DEL ARTÍCULO	ASPECTOS	
Depresión e ideación suicida. Variables asociadas al riesgo y protección en universitarios mexicanos	Autores	Pedro Solís, Cámara R. Rosa Martha Meda Lara, Bernardo Moreno Jiménez, Andrés Palomera Chávez.
	Lugar y Fecha	México (2018)
	Objetivo	Identificar variables protectoras y de riesgo para la depresión y conocer cuáles de éstas discriminan entre universitarios con ideación suicida (IS) y aquellos quienes no la tienen.
	Metodología	Observacional de corte trasversal
	Participantes	Adolescentes, jóvenes
	Instrumentos	Escala de Ideación Suicida de Roberts-CES-D, Escala de Depresión
	Resultados	Las variables asociadas con depresión e ideación suicida fueron la sintomatología psicosomática, el bienestar psicológico y la calidad de vida.
	Conclusiones	Se sugiere la inclusión de estas variables protectoras en programas preventivos y de promoción de la salud en general y de la salud mental en particular.

NOMBRE DEL ARTÍCULO	ASPECTOS	
Riesgo Suicida en Adolescentes de Secundaria en Tlaxcala.	Autores	María Mónica Anastacia Quitl Meléndez, Alejandro Nava Ernult, Sacnite Jiménez Canseco.
	Lugar y Fecha	México (2019)
	Objetivo	El objetivo de la presente investigación es detectar el riesgo suicida en adolescentes de secundaria previamente identificados con conductas autolesivas, de acoso escolar y trastornos de conducta
	Metodología	Observacional de corte trasversal
	Participantes	Adolescentes
	Instrumentos	Inventario de Riesgo Suicida para Adolescentes (IRISA), la Escala de Evaluación de la Cohesión y Adaptabilidad Familiar (FACES III)
	Resultados	Los resultados mostraron que la mayoría de los adolescentes evaluados presentó niveles de riesgo suicida, siendo los hombres quienes presentan mayor alerta de riesgo y las mujeres mayor riesgo de tentativa y de ideación, las mujeres mostraron un índice de malestar psicológico en alerta de riesgo.
	Conclusiones	En la prevención del suicidio se deben proponer estrategias para integrar hábitos de autocuidado en salud y las situaciones de riesgo por las que puede pasar un niño o adolescente, además de generar factores protectores.

NOMBRE DEL ARTÍCULO	ASPECTOS	
Depresión e ideación suicida en los adolescentes de una Institución Educativa Pública del distrito de Chongos Bajo - Perú 2014.	Autores	Nesil Flores Palian, Yesenia Perales Rojas, Walter Gómez Gonzales
	Lugar y Fecha	Perú (2016)
	Objetivo	Determinar la relación que existe entre depresión e ideación suicida en los adolescentes de una Institución Educativa Publica del Distrito de Chongos Bajo-Chupaca 2014.
	Metodología	Observacional corte trasversal
	Participantes	Adolescentes
	Instrumentos	Escala de valoración de Hamilton para evaluar Depresión, Escala de Ideación Suicida de Beck (ISB)
	Resultados	La ideación suicida grave se relaciona significativamente con la depresión severa. Siendo su coeficiente de correlación 0,829 significativa al nivel 0,01 (2 Colas/ Bilateral)
	Conclusiones	Es necesario, importante e ineludible la implementación de programas preventivos de la depresión e ideación suicida y de intervención en favor de los estudiantes de esta Institución Educativa y de otras de escenarios socio geográficos.

NOMBRE DEL ARTÍCULO	ASPECTOS	
Prevalencia y factores asociados con la conducta suicida en adolescentes de Lima rural.	Autores	José L. Bazán-López, Víctor M. Olortegui-Malaver, Horacio B. Vargas-Murga, Leandro Huayanay-Falconí.
	Lugar y Fecha	Perú (2016)
	Objetivo	Identificar la prevalencia y los factores asociados con tendencias suicidas en adolescentes de Lima rural
	Metodología	Observacional de corte trasversal
	Participantes	Adolescentes.
	Instrumentos	Análisis secundario
	Resultados	La prevalencia de vida del deseo de morir y del pensamiento suicida en adolescentes fue 21,4 y 7,4% respectivamente, con asociaciones estadísticamente significativas para el deseo de morir con: sexo femenino, hecho que avergonzara la familia, reglas y castigos, apoyo del hermano, tener amigo confidente, importancia de Dios en la vida, trastorno de ansiedad generalizada y depresión mayor
	Conclusiones	Se encontró asociaciones estadísticamente significativas del pensamiento suicida con las siguientes variables: contar con cancha de vóley, cuánto le importa si hiciera algo que avergonzara a su familia y tener amigo confidente.

NOMBRE DEL ARTÍCULO	ASPECTOS	
Frecuencias y Características Sociodemográficas del Intento de Suicidio En Adolescentes Atendidos en el Hospital III Goyeneche de Arequipa entre los Años 2013 Al 2017.	Autores	Andrea Milagros Puma Apasa.
	Lugar y Fecha	Perú (2018)
	Objetivo	Determinar la frecuencia y características sociodemográficas del intento de suicidio en adolescentes atendidos en el Hospital III Goyeneche de Arequipa entre los años 2013 al 2017.
	Metodología	Observacional de corte trasversal
	Participantes	Adolescentes
	Instrumentos	Revisión de registros.
	Resultados	Prevalencia de intento de suicidio entre los años de estudio fue de 3.2%. con mayor prevalencia en la adolescencia tardía 45,7% y con relación al sexo fue más frecuente en mujeres el 68.3%
	Conclusiones	Dentro de las características sociodemográficas vemos el predominio del sexo femenino, en su mayoría estudiantes y solteros. Dentro de las comorbilidades psiquiátricas las de mayor predominio son disfunción familiar, trastorno adaptativo y depresión. Siendo el método más utilizado intoxicación por sustancias tóxicas por ser de fácil acceso y preparación

NOMBRE DEL ARTÍCULO	ASPECTOS	
Relación entre estrés académico e ideación suicida.	Autores	Andy Sánchez-Villena.
	Lugar y Fecha	Perú (2018)
	Objetivo	Valorar la relación entre estrés académico e ideación suicida en los alumnos de las universidades Gallegas
	Metodología	Observacional de corte trasversal
	Participantes	Adolescentes y jóvenes
	Instrumentos	SISCO de estrés académico, Escala de Ideación Suicida de Beck (SSI)
	Resultados	La muestra consta de 151 alumnos. Correlación directa negativa entre estrés e ideación suicida. Una correlación significativa entre estrés y los ítems relacionados con pérdida de esperanza y presentar problemas graves
	Conclusiones	Los resultados indican una correlación significativa, directa y baja entre el estrés académico y la ideación suicida

NOMBRE DEL ARTÍCULO	ASPECTOS	
Influencia de la depresión en la ideación suicida de los estudiantes de la selva peruana.	Autores	Jhonny Vidal Astocondor Altamirano, Luis Enrique Ruiz Solsol Christian R. Mejía.
	Lugar y Fecha	Perú (2019)
	Objetivo	Determinar la influencia de la depresión en la ideación suicida de los estudiantes de la selva peruana.
	Metodología	Observacional descriptivo
	Participantes	Adolescentes
	Instrumentos	Escala de Ideación Suicida de Beck (SSI) modificada y la escala de Birleson modificada para Perú
	Resultados	Se identificó fuerte asociación entre la ideación suicida y depresión (valor $p < 0,01$). los estudiantes universitarios con depresión presentaron con mayor frecuencia ideas suicidas
	Conclusiones	Se encontró una asociación entre las variables ideación suicida y depresión, que está caracterizada por algunas percepciones y conductas que develan serios problemas de la esfera mental, lo que debe ser tomado en cuenta por las entidades educativas, para generar programas de detección y ayuda a los jóvenes estudiantes.

NOMBRE DEL ARTÍCULO	ASPECTOS	
<p>Suicide Attempts and Course of Suicidal Ideation among Puerto Rican Early Adolescents. ..</p>	Autores	Ana Ortin & Katherine S. Elkington & Ruth Eisenberg ³ & Regina Miranda, & Glorisa Canino & Hector R. Bird & Cristiane S. Duarte
	Lugar y Fecha	Puerto Rico (2019)
	Objetivo	Este estudio informa sobre la prevalencia de la ideación suicida, los intentos de suicidio y el curso de la ideación suicida entre los primeros adolescentes puertorriqueños
	Metodología	Observacional longitudinal
	Participantes	Adolescentes y sus padres
	Instrumentos	Ideación e intentos suicidas basado en el DISC-IV para padre y para niños
	Resultados	La prevención debe centrarse en las niñas y aquellas con ansiedad o trastornos disruptivos. Cuando la ideación es recurrente, las intervenciones orientadas a reducir la conducta disruptiva y sus consecuencias pueden ayudar a lograr la remisión.
	Conclusiones	Se sugiere que las estrategias de prevención e intervención que se dirigen a la ideación suicida en la adolescencia temprana entre los jóvenes de alto riesgo son necesarias para prevenir intentos de suicidio posteriores

NOMBRE DEL ARTÍCULO	ASPECTOS	
Funcionalidad familiar y riesgo de ideación suicida en adolescentes	Autores	José Santos, Flor Amalia Hurtado Cáceres.
	Lugar y Fecha	Venezuela (2018)
	Objetivo	Determinar la relación entre funcionalidad familiar y riesgo de ideación suicida en adolescentes.
	Metodología	Descriptivo, corte transversal y diseño correlacional
	Participantes	Adolescentes
	Instrumentos	Escala de MAG, y Riesgo Suicida Adolescente de Vinicio y Campos.
	Resultados	De una muestra de 59 adolescentes hubo prevalencia de mujeres el 52.54%, en edad entre 16 y 17 años. La funcionalidad familiar percibida por los adolescentes presenta una relación con el riesgo de ideación suicida.
	Conclusiones	Existe relación entre la funcionalidad familiar con el riesgo de ideación suicida.

NOMBRE DEL ARTÍCULO	ASPECTOS	
Ideación suicida y desesperanza en una muestra de adolescentes barquisimetanos.	Autores	Claudia Molina.
	Lugar y Fecha	Venezuela (2019)
	Objetivo	Estudiar la relación entre la presencia de ideación suicida y la desesperanza como elemento psicológico en adolescentes con edades entre catorce y diecisiete años.
	Metodología	Observacional de corte trasversal.
	Participantes	Adolescentes
	Instrumentos	Escala de Ideación Suicida de Roberts-CES-D, “Escala de Desesperanza HS
	Resultados	Los hallazgos muestran correlación entre la presencia de ideación suicida de baja duración y un nivel moderado de desesperanza.
	Conclusiones	Más allá de la significancia estadística que constituyen tales resultados, un porcentaje tan alto de un nivel moderado de desesperanza, representa desde la perspectiva clínica, el pronóstico de futuras situaciones disfuncionales tanto psicoafectivos como conductuales en tales adolescentes, ya que la desesperanza como elemento psicológico modula la forma en que el adolescente enfrenta su vida escolar, familiar y social”

Fuente: elaboración propia.

Discusión

La revisión de la literatura evidencia el análisis de la ideación y las conductas suicidas en los adolescentes, permitiendo identificar factores de riesgo suicida en la población adolescente. De acuerdo con esto, después de la búsqueda se agruparon las categorías más importantes que se encontraron en los estudios a nivel de Colombia y de América Latina y regional. A continuación, se presentan algunas de las perspectivas que son más recurrentes en las investigaciones sobre el tema.

Intención de suicidio en adolescentes en Colombia

Aspectos generales

El intento de suicidio se presenta principalmente en mujeres, adultos jóvenes y adolescentes menores de 19 años, siendo la intoxicación el método más utilizado. A más cercanía del intento, mayor es la probabilidad de reincidencia (22-24).

Factores de riesgo en Colombia

Disfunción Familiar: La familia es el núcleo formador del hombre en la sociedad, donde se fomentan los valores, principios y buen comportamiento que prevalecerán en la persona durante toda la vida, el ser una familia disfuncional es un factor de riesgo de interés para intento suicida en adolescentes en Colombia. La percepción de los adolescentes con relación a la familia y la calidad de la comunicación con los padres son clave en la prevención de la ideación suicida; los esfuerzos para la prevención deben incluir el núcleo familiar. La evidencia indica que la dinámica del grupo familiar influye directa o indirectamente sobre las conductas suicidas de un miembro del grupo familiar (24-27).

Aspectos sociales que amenazan el bienestar del adolescente:

Durante la adolescencia los menores experimentan transformaciones, motivaciones, intereses, pensamientos. La relación con el entorno, lo expone a nuevas experiencias; los problemas a que se enfrentan los adolescentes en esta etapa de la vida pueden ser: escolares (acoso escolar), ciberacoso, desigualdad social, consumo de sustancias psicoactivas, la identidad sexual y el abuso sexual.

El acoso escolar es visto como las acciones deliberadas de agresiones físicas o psicológicas que buscan lastimar o dominar el otro, suele presentarse entre adolescentes; esta problemática y las demás situaciones problemáticas escolares como el bajo rendimiento, pueden desencadenar un intento suicida en esta edad (28).

Palacios et al, mencionan que el acoso escolar puede presionar a quien lo padece, porque lo afecta de manera considerable en su estado emocional, físico y mental; la burla, el rechazo, y demás agresiones le producen sentimientos como tristeza, miedo, ansiedad (29). Siguiendo la línea del acoso, el uso cada vez más creciente de las tecnologías, ha llevado a otra modalidad de acoso que trasciende a la escuela o el trabajo, el ciberacoso, el *ciberbullying*, que a través de las redes sociales está provocando dificultades en la salud mental de las jóvenes, expresadas a través de síntomas depresivos, ideación suicida e intentos de suicidio (30).

Con relación a la sexualidad, la adolescencia es una edad en la que la persona inicia la identidad sexual, esta situación se ha identificado como factor de riesgo para la ideación y el intento suicida; la ideación suicida suele ser mayor en las edades donde se identifica la propia orientación sexual (entre los 15 y los 17 años) y en adolescentes que se declaran homosexuales, los factores de riesgo de ideación suicida son el abuso sexual, la homofobia y la edad cronológica (31, 32).

Enfermedad física y mental

El intento de suicidio en adolescentes tiene diferentes causas y entre las que se identifica la enfermedad mental o los trastornos de conducta y el consumo de sustancias psicoactivas, estos se constituyen en factores de riesgo para la intención de suicidio, en este sentido, el suicidio nunca es el resultado de un solo factor o hecho. Usualmente lo causa una compleja interacción de muchos factores tales como enfermedad mental y física, autoestima baja, ineffectividad, anhedonia, abuso de sustancias, conflictos familiares e interpersonales y acontecimientos estresantes (23, 24).

El conocimiento de los factores relacionados, aporta hacia la prevención; Cervantes et al, concluyen que para la prevención del intento de suicidio es necesario tener en cuenta a mujeres menores de 16 años, con autoestima negativa, con un desorden psiquiátrico, en ambiente familiar no favorable; con riesgo de consumo de tabaco, alcohol o drogas o violencia sexual (28).

Intención de suicidio en adolescentes en latinoamericana

Aspectos generales

En Latinoamérica, con relación al deseo de morir en adolescentes, se encontró mayor prevalencia en el género femenino; algunas manifestaciones relacionadas con causar vergüenza a su familia, el sentir que las reglas y castigos son injustos, sentir nada o poco apoyo del hermano, sentirse molesto o desesperado o presentar un trastorno de ansiedad o depresión y en otros casos sentimiento de inferioridad (33-37).

Los pensamientos típicos en adolescentes, como la generalización, la polarización de pensamiento, dar relevancia a los aspectos negativos de sus experiencias, son riesgos para la ideación suicida del adolescente (35).

Factores de riesgo en Latinoamérica

Disfunción familiar: Es de gran relevancia considerar que la familia juega un papel importante en la determinación de un adolescente al decidir atentar contra su vida o no, puesto que, la estrecha relación y dependencia de la familia inmediata empieza a ceder por relaciones intensas con el grupo de pares y adultos fuera de la familia. Por tal motivo, la familia puede convertirse en un factor determinante para el desarrollo psicológico y personal del adolescente. La familia disfuncional genera un ambiente de estrés al adolescente y lo puede llevar a soluciones inadecuadas, a enviar mensajes equivocados como los comportamientos de autoagresión, ya que carece de mecanismos de afrontamiento apropiados.

Es en la familia, el primer ambiente donde el adolescente adquiere las condiciones para formar y desarrollar una personalidad que le acompaña por el resto de la vida y que le permitirá la adaptación a todos los procesos de cambio que experimenta, proporcionando seguridad, confianza y crecimiento personal. La familia frente al proceso de tránsito del adolescente es necesario que mantenga la estabilidad, y así ayudarlo a enfrentar la evolución y los cambios propios del desarrollo.

Los trabajos investigativos en la región sugieren el papel de la familia en este fenómeno del adolescente, llegando a existir una relación entre los intentos suicidas con los problemas relacionados con el entorno, la composición del núcleo familiar, y con las relaciones interpersonales. Para los países de Latinoamérica la familia es fundamental en el desarrollo del adolescente en el tránsito a la juventud, el grado de función o disfunción familiar se ha considerado un factor de riesgo para la intención de suicidio de este grupo poblacional; se ha identificado que el adolescente tiene mayor probabilidad de intención de suicidio si pertenece a una familia disfuncional (38-44).

Depresión y estados de ánimo

Los estudios reflejan la presencia simultánea de depresión e ideación suicida especialmente porque los adolescentes tienen vivencias difíciles de superar, suelen cursar con sentimientos contradictorios; puede estar triste, irritable, puede manifestar enojo o mal humor, que lo pueden llevar a niveles patológicos y aparecer sentimientos propios sobre su muerte y sobre la idea suicida; la evidencia en los diferentes países refleja el efecto de la depresión de los estudiantes en la conducta suicida (39, 40, 42, 45-47). Los sentimientos emociones y estados de ánimo también se han incluido entre los factores que favorecen la conducta suicida, el enojo, la irritabilidad, la angustia, la ansiedad, entre otros, que afectan la autoestima y generan perturbación emocional, hacia emociones negativas que los exponen a pensamientos suicidas (33, 40, 48, 49).

Desesperanza y estrés

La adolescencia como periodo de transición suele generar situaciones que impactan el bienestar psicológico saludable, el adolescente puede sentir que no sabe cómo responder a las exigencias sociales y familiares, que lo lleva a un sentimiento de desesperanza y a probablemente a pensamientos de autolesión. A nivel universitario se presentan otros factores como es el apoyo social percibido por el adolescente, el nivel de estrés por las jornadas académicas que se unen a la situación familiar; es así como a una mayor cohesión familiar, habrá menor ideación e intencionalidad, depresión y desesperanza (50-52).

El estrés tiene relación con los aspectos académicos principalmente; se encontró que, a nivel académico existe un volumen importante de estudiantes entre la adolescencia y adultez temprana sometidos a fac-

tores que pueden comprometer su salud mental (depresión, autoestima baja, ansiedad, estrés etc.). Estos factores son del orden académico como, exámenes, educación centrada en la conducta, rendimiento académico, factores personales como decepciones amorosas, nuevas responsabilidades, factores sociales como dificultades económicas, la separación de la familia; el estrés percibido por los adolescentes suele ser generador de trastornos en la salud mental (50, 51).

Desde un enfoque étnico y cultural, los adolescentes de los territorios indígenas viven el fenómeno social y cultural que está relacionado con violencias sociales, políticas, culturales y económicas; encuentran que el suicidio es la expresión de un daño a nivel psicosocial, por prácticas frecuentes de invasión que amenazan la identidad cultural y generan discriminación (53).

Conclusiones

La variedad de sentimientos que sufren los humanos en el desarrollo de su vida, específicamente en la transición de su niñez a la adolescencia, tienen una transcendencia básica y estructurada de los procesos de la vida, que varían desde la parte propia del ser humano, la constitución social primaria como lo es la familia, el entorno económico, comunitario, educacional, político, sexual; en fin, siendo el ser humano un ser holístico, en la adolescencia se generan procesos en cada una de las áreas del desarrollo, estos procesos alteran la psiquis cuando no hay resiliencia.

La familia como núcleo fundamental para la sociedad juega un papel relevante en el intento suicida tanto para Latinoamérica, incluyendo Colombia; las dificultades en las relaciones, la comunicación conflictiva y en general relaciones inestables son factores de riesgo para este

evento, que se considera de alto impacto en salud pública.

El estrés es un factor de riesgo importante para la ideación suicida en los países de Latinoamérica, sin embargo, en Colombia los estudios no lo reflejan como un factor de riesgo, la última encuesta del índice mundial de la felicidad ubica a Colombia como un país con mayor percepción de felicidad.

Limitaciones: La dificultad para acceder a literatura con acceso restringido dado el costo que representa.

Implicaciones para investigaciones futuras: Los resultados de la presente revisión se constituyen en la base para establecer investigación empírica que permita plantear modelos de cuidado a partir del riesgo y que faciliten la reincorporación del adolescente a la sociedad.

Bibliografía

1. Organización Mundial para la Salud. 2016. Salud del adolescente. Disponible en: https://www.who.int/maternal_child_adolescent/topics/adolescence/dev/es/ Accedido: 2021 junio 12.
2. Organización Mundial para la Salud. 2014. “Prevención del suicidio: un imperativo social”. Disponible en: https://www.who.int/mental_health/suicide-prevention/es/ Accedido: 2021 junio 21.
3. Organización Panamericana de la Salud 2018. Suicidio en jóvenes en América Latina. Disponible en: <https://distintaslatitudes.net/explicadores/suicidio-jovenes-en-america-latina> Accedido: 2021 junio 10.

4. Ministerio de Salud y Protección Social. 2015. Encuesta Nacional de Salud Mental. Disponible en: http://www.odc.gov.co/portals/1/publicaciones/pdf/consumo/estudios/nacionales/co031102015-salud_mental_tomoi.pdf Accedido: 2021 marzo 31.
5. Papalia DE, Wendkos S, Duskin R. Psicología del desarrollo: De la infancia a la adolescencia. Undécima edición. Mc Graw Hill, México, D.F. 2009.
6. Larson R, Wilson S. Adolescence across place and time: Globalization and the changing pathways to adulthood. In Lerner RM, Steinberg L. (Eds.), Handbook of adolescent psychology (2nd ed), John Wiley & Sons Inc. Hoboken, 2004. págs. 299-331.
7. Organización Mundial para la Salud. 2000. La salud de los jóvenes un desafío para la sociedad. Disponible en: Accedido: 2021 junio 21.
8. Organización Mundial para la Salud. 2000. Salud del adolescente y el joven adulto. Disponible en: <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/adolescents-health-risks-and-solutions> Accedido: 2021 junio 21.
9. Ministerio de Salud y Protección Social. Boletín de salud mental: Conducta suicida [Internet]. Ministerio de Salud y Protección Social. Bogotá D.C.; 2018. Available from: <https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/EN T/boletin-conducta-suicida.pdf>
10. Nizama M. Suicidio. Revista Peruana de Epidemiología [Internet] 2011 [Citado 2021 junio 26];15(2): 81-85. Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=203122516002>
11. Anaya NC. Diccionario de Psicología. Anaya NC. (Ed.), 2a ed. Ecoe Ediciones, Bogotá 2010.

12. Franklin JC, Ribeiro JD, Fox KR, Bentley KH, Kleiman EM, Huang X, et al. Risk factors for suicidal thoughts and behaviors: A meta-analysis of 50 years of research. *Psychol Bull.* 2017;143(2):187-232. <https://doi.org/10.1037/bul0000084>
13. Castellví P, Miranda-Mendizábal A, Parés-Badell O, Almenara J, Alonso I, Blasco MJ, et al. Exposure to violence, a risk for suicide in youths and young adults. A meta-analysis of longitudinal studies. *Acta Psychiatr Scand.* 2017;135(3):195-211. <https://doi.org/10.1111/acps.12679>
14. Castellví P, Lucas-Romero E, Miranda-Mendizábal A, Parés-Badell O, Almenara J, Alonso I, et al. Longitudinal association between self-injurious thoughts and behaviors and suicidal behavior in adolescents and young adults: A systematic review with meta-analysis. *Affect Disord.* 2017;215:37-48. <https://doi.org/10.1016/j.jad.2017.03.035>
15. Miranda-Mendizábal A, Castellví P, Parés-Badell O, Almenara J, Alonso I, Blasco MJ, et al. Sexual orientation and suicidal behaviour in adolescents and young adults: systematic review and meta-analysis, *Br J Psychiatry.* 2017;211(2):77-87. <https://doi.org/10.1192/bjp.bp.116.196345>
16. Gili M, Castellví P, Vives M, De la Torre-Luque A, Almenara J, Blasco MJ, et al. Mental disorders as risk factors for suicidal behavior in young people: A meta-analysis and systematic review of longitudinal studies, *J Affect Disord.* 2019;245:152-162. <https://doi.org/10.1016/j.jad.2018.10.115>
17. Castellví-Obiols P, Piqueras JA. El suicidio en la adolescencia: un problema de salud pública que se puede y debe prevenir. *Revista de estudios de juventud.* [Internet] 2019 [Citado 2021 junio 26];121: 45-59. Disponible en: http://www.injuve.es/sites/default/files/adjuntos/2019/06/3.el_suicidio_en_la_adolescencia_un_problema_de_salud_publica_

que_se_puede_y_debe_prevenir.pdf

18. Díaz Chavarro BC, Cifuentes Ortiz ME. Representaciones sociales de la violencia basada en género en estudiantes de Enfermería. En: Zambrano Bermeo RN, Marín Muñoz JA. (eds.). *Mujeres, Salud y Cotidianidad. ¿Iguales o diferentes?* Editorial Universidad Santiago de Cali; Cali, 2020. pp 119-168.
19. Suárez Y, Restrepo D, Caballero C, Palacio J. Exposición a la Violencia y Riesgo Suicida en Adolescentes Colombianos. *Ter Psicol* 2018;36(2):101-111. <https://doi.org/10.4067/S0718-48082018000200101>.
20. Tricco AC, Lillie E, Zarin W, O’Brine KK, Colquhoun H, Levac D, et al. PRISMA extension for scoping reviews (PRISMA-ScR): checklist and explanation. *Ann Intern Med* 2018;169:467-473. Doi: 10.7326/M18-0850
21. Joanna Briggs Institute, 2020. Checklist for systematic reviews and research syntheses. Disponible en: <https://joannabriggs.org/critical-appraisal-tools> Accedido: 2021 junio 12.
22. Alvis-Ñungo LF, Soto-Morales AM, Grisales-Romero H. El intento de suicidio en Ibagué: El silencio de una voz de auxilio. *Rev Crim.* [Internet] 2017 [Citado 2021 mayo 9];59(2): 81-92. Disponible en: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=s1794-31082017000200081&lng=en&tlng=es
23. Siabato-Macías EF, Forero-Mendoza IX, Salamanca-Camargo Y. Asociación entre depresión e ideación suicida en un grupo de adolescentes colombianos. *Pensamiento psicológico*, 2017;15(1):51-61. <https://doi.org/10.11144/Javerianacali.PPSI15-1.ADIS>

24. Castaño Castrillón JJ, Cañón SC, Betancur M, Castellanos Sánchez PL, Guerrero González J, Gallego Rivas A, et al. Factor de riesgo suicida según dos cuestionarios, y factores asociados en estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia sede Manizales. *Diversitas: Perspectivas en Psicología* [Internet]. 2015 [Citado 2021 mayo 9];11(2): 193-205. Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=67944781002>
25. Núñez-Ariza A, Reyes Ruiz L, Sánchez-Villegas M, Carmona FA, Acosta-López J. Ideación suicida y funcionalidad familiar en adolescentes del Caribe colombiano. *Revista AVFT* [Internet] 2020 [Citado 2021 mayo 9];39(1): 109-116. Disponible en: <https://bonga.unisimon.edu.co/handle/20.500.12442/5358>
26. Forero I, Siabato E, Salamanca Y. Ideación suicida, funcionalidad familiar y consumo de alcohol en adolescentes de Colombia. *Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud*, 2017;15(1):431-442. <https://doi.org/10.11600/1692715x.1512729042016>
27. Suárez Colorado Y, Campo-Arias A. Asociación entre apego y riesgo suicida en adolescentes escolarizados de Colombia. *Rev. Chil. Pediatr.* 2019;90(4): 392-398. <https://doi.org/10.32641/rchped.v90i4.985>.
28. Cervantes W, Melo Hernández E. El suicidio en los adolescentes: un problema en crecimiento. *Duazary*, 2008;5(2):148-154. <https://doi.org/10.21676/2389783X.669>
29. Palacio-Chavarriaga C, Rodríguez-Marín LJ, Gallego-Henao AM. Sentimientos y pensamientos de jóvenes frente al acoso escolar: el suicidio como una alternativa. *Revista Eleuthera*, 2019;21:34-47. <https://doi.org/10.17151/eleu.2019.21.3>

30. Escobar Echavarría J, Montoya González LE, Restrepo Bernal D, Mejía-Rodríguez D. Ciberacoso y comportamiento suicida. ¿cuál es la conexión? a propósito de un caso. *Rev. Colomb. Psiquiatr.* 2016;46(4): <https://doi.org/10.1016/j.rcp.2016.08.004>
31. Pineda-Roa CA. Factores de riesgo de ideación suicida en una muestra de adolescentes y jóvenes colombianos auto-identificados como homosexuales. *Rev. Colomb. Psiquiatr.* 2019;48(1):2-9. <https://doi.org/10.1016/j.rcp.2017.06.001>
32. Pérez Prada MP, Martínez Baquero LC, Vianchá Pinzón MA, Avendaño Prieto BL. Intento e ideación suicida y su asociación con el abuso sexual en adolescentes escolarizados de Boyacá-Colombia. *Diversitas: Perspectivas en Psicología.* [Internet] 2017 [Citado 2021 junio 9];13(1): 91-101. Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=67952833007>
33. Bazán-López JL, Olórtegui-Malaver VM, Vargas-Murga HB, Huayanay-Falconí L. Prevalencia y factores asociados con la conducta suicida en adolescentes de Lima rural. *Rev Neuropsiquiatr* [Internet] 2016 [Citado 2021 junio 9];79(1): 3-16. Disponible en: http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-85972016000100002&lng=es.
34. Ardiles Irarrázabal RA, Díaz Mancilla I, Martínez Guzmán VV, Alfaro Robles PA. Riesgo de suicidio adolescente en localidades urbanas y rurales por género, región de Coquimbo, Chile. *Aquichan*, [Internet] 2018 [Citado 2021 junio 9];18(2). Disponible en: <https://aquichan.unisabana.edu.co/index.php/aquichan/article/view/8619>
35. Álvarez LV, Ayala Moreno NY, Bascuñán Cisternas R. Las distorsiones cognitivas y el riesgo de suicidio en una muestra de adolescentes chilenos y colombianos: un

- estudio descriptivo-correlacional. *Psicogente* 2019;22(41):1-22. <https://doi.org/10.17081/psico.22.41.3308>
36. Kaplan CV, Szapu E. Jóvenes y subjetividad negada: Apuntes para pensar la intervención socioeducativa sobre prácticas autolesivas y suicidio. *Psicoperspectivas*, 2019;18(1):1-11. <https://doi.org/10.5027/psicoperspectivas-vol18-issue1-fulltext-1485>.
37. Nogueira da Fonseca PH, Conceição Silva A, Martins Costa de Araújo L, Botti Lappann Botti NC. Autolesão sem intenção suicida entre adolescentes. *Arq. Bras. Psicol.* [Internet]. 2018 [citado 2021 Jul 17]; 70(3): 246-258. Disponible em: http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1809-52672018000300017&lng=pt.
38. Yais Palanqué Y, Yais Elcea J. Comportamiento del intento suicida en adolescentes del policlínico “Julio Grave de Peralta”. Febrero 2017 – marzo 2018. Repositorio, Disponible en: <https://tesis.hlg.sld.cu/index.php?P=FullRecord&ID=806&ReturnText=Search+Results&ReturnTo=index.php%3FP%3DAdvancedSearch%26Q%3DY%26G75%3D515%26RP%3D5%26SR%3D40%26SD%3D1>
39. Aguirre Gordón AM, Auquilla Salcán IC. Detección temprana de ideación suicida e identificación de los factores de riesgo asociados, en adolescentes de dos unidades educativas del sur de la ciudad de Quito en el periodo septiembre 2017 a febrero 2018. Repositorio. Disponible en: <http://repositorio.puce.edu.ec/handle/22000/14768>
40. Ordóñez Fernández AE. Conducta suicida en adolescentes y factores asociados. Repositorio. Disponible en: <http://repositorio.utmachala.edu.ec/bitstream/48000/13964/1/ORDO%C3%91EZ%20FERNANDEZ%20ADRIANA%20ELIZABETH.pdf>

41. Puma Apaza AM. Frecuencias y características sociodemográficas del intento de suicidio en adolescentes atendidos en el Hospital III Goyeneche de Arequipa entre los años 2013 al 2017. Repositorio. Disponible en: <http://repositorio.unsa.edu.pe/handle/UNSA/5557>
42. Astocondor Altamirano JV, Ruiz Solsol LE, Mejía CR. Influencia de la depresión en la ideación suicida de los estudiantes de la selva peruana. *Horiz. Med.* 2019;19(1):53-58. <https://doi.org/10.24265/horizmed.2019.v19n1.09>.
43. Hurtado Cáceres FA. Funcionalidad familiar y riesgo de ideación suicida en adolescentes I. E. José Santos Atahualpa. Arequipa 2018. Repositorio. Disponible en: <http://repositorio.unsa.edu.pe/handle/UNSA/10821>
44. Gerstner RMF. Factores predictores y protectores para tendencias suicidas en adolescentes en una zona afectada por el terremoto del 16 de abril en Ecuador. Repositorio. Disponible en: <http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/6586>
45. Solís-Cámara P, Meda Lara RM, Moreno Jiménez B, Palomera Chávez A. Depresión e ideación suicida Variables asociadas al riesgo y protección en universitarios mexicanos. *RIP* 2018;11(1):11-12 <https://doi.org/10.33881/2027-1786.rip.11104>
46. Flores Palian N, Perales Rojas Y, Gómez Gonzales W. Depresión e ideación suicida en los adolescentes de una Institución Educativa Pública del distrito de Chongos Bajo - Perú 2014. *Ágora*, 2016;3(1):265-274. <https://doi.org/10.21679/arc.v3i1.50>
47. Rodríguez González A. Caracterización clínica y sociodemográfica de los pacientes con ideación suicida e intentos de autoeliminación en la población de 4 a 13 años, atendidos en el Hospital Nacional de Niños “Dr. Carlos Sáenz Herrera” del 01 de junio de 2012 al 01 de junio de 2018. [Inter-

- net] 2018 [Citado 2021 junio 26]; Disponible en: <http://www.kerwa.ucr.ac.cr/handle/10669/81003>
48. Ortin A, Elkington KS, Eisenberg R, Miranda R, Canino G, Bird HR, Duarte CS. Suicide Attempts and Course of Suicidal Ideation among Puerto Rican Early Adolescents. *J Abnorm Child Psychol.* 2019;47(10):1723-1734. <https://doi.org/10.1007/s10802-019-00554-1>.
49. Paredes Ballesteros S, Pérez Sánchez O. El riesgo suicida y la auto identificación étnica en adolescentes indígenas de Quisapincha, Ecuador. Repositorio. Disponible en: <https://repositorio.uisek.edu.ec/bitstream/123456789/3781/1/Art%C3%ADculo%20Paredes%20Ballesteros%20Santiago%2%A0-%20P%C3%A9rez%20S%C3%A1nchez%20%C3%93scar.pdf>
50. Molina Salas C. Ideación suicida y desesperanza en una muestra de adolescentes barquisimetanos. *Boletín Médico de Postgrado [Internet]* 2016 [Citado 2021 junio 9] Disponible en: <132626775.pdf> (core.ac.uk)
51. Sánchez-Villena A. Relación entre estrés académico e ideación suicida. *Eureka. [Internet]* 2018 [Citado 2021 junio 9];15(1): 27-38. Disponible en: https://psicoeureka.com.py/sites/default/files/articulos/eureka-15-1-9_0.pdf
52. Quitl Meléndez MMA, Nava Ernult A, Jiménez Canseco S. Riesgo Suicida en Adolescentes de Secundaria en Tlaxcala. En: Educación. Marroquín A, Olivares J (eds.) *Handbooks ECORFAN-México*, Querétaro 2020. <https://doi.org/10.35429/H.2020.5.2.112.121>
53. Arroyo Araya H, Herrera González DG. Análisis psicosocial del suicidio en personas jóvenes indígenas Bribris. *Reflexiones*, 2019;98(2):7-22. <https://doi.org/10.15517/rr.v98i2.34665>

